

Resposta aos Recursos Prova de Residência Médica e Especialização em Cirurgia Cardiovascular

34. A gestação de risco pode ser definida por aquela que é complicada pelos itens abaixo, EXCETO:

- a) Idade materna inferior a 18 anos e superior a 35 anos
- b) Peso materno inicial inferior a 50kg
- c) Estatura materna inferior a 150cm
- d) Mães solteiras
- e) Mães sedentárias

QUESTÃO ANULADA, RECURSO ACATADO

43. Colecistectomia Videolaparoscópica é indicada para todas as condições clínicas, exceto:

- a) Carcinoma de vesícula
- b) Colecistite Aguda
- c) Pancreatite biliar
- d) História familiar de colelitíase
- e) Pólipos múltiplos

SERÃO CONSIDERADAS AS RESPOSTAS A E D

53. Colecistectomia Videolaparoscópica é indicada para todas as condições clínicas, exceto:

- a) Carcinoma de vesícula
- b) Tratamento inicial em pacientes com colangite severa
- c) Colecistite aguda
- d) Colelitíase sintomática
- e) Pancreatite biliar

SERÃO CONSIDERADAS AS RESPOSTAS A E B

71. Em relação às hérnias inguinais, é correto afirmar:

- a) A hérnia femoral (hérnia crural) é mais frequente em homens.
- b) Na hérnia inguinal direta ocorre protrusão do saco hérnia lateralmente aos vasos epigástricos inferiores.
- c) A hérnia deslizante ocorre somente na região inguinal.

QUESTÃO ANULADA